

# THIOLCHICOSIDE ET GÉNOTOXICITÉ : GUIDE À L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LE THIOLCHICOSIDE (COLTRAMYL® RELAXOL® OU UN AUTRE GÉNÉRIQUE) EST INDIQUÉ DANS LE TRAITEMENT D'APPOINT DES CONTRACTURES MUSCULAIRES DOULOUREUSES EN PATHOLOGIE RACHIDIENNE AIGUË CHEZ LES ADULTES ET LES ADOLESCENTS À PARTIR DE 16 ANS.

LE THIOLCHICOSIDE DOIT ÊTRE STRICTEMENT PRESCRIT AUX **DOSES RECOMMANDÉES ET MAXIMALES** :

Formes orales	<b>8 mg toutes les 12 heures</b> (soit 16 mg par jour)	durée du traitement limitée à <b>7 jours</b> consécutifs
Formes intramusculaires	<b>4 mg toutes les 12 heures</b> (soit 8 mg par jour)	durée du traitement limitée à <b>5 jours</b> consécutifs

Les doses dépassant les doses recommandées ou l'utilisation à long terme doivent être évitées.

## INFORMATION DE TOLERANCE A TRANSMETTRE AUX PATIENTS AU MOMENT DE LA PRESCRIPTION DE THIOLCHICOSIDE

Des études chez l'animal, réalisées à des concentrations proches de celles observées chez l'homme lors de l'administration par voie orale du thiolchicoside aux doses maximales recommandées de 8 mg deux fois par jour, ont montré que l'un de ses métabolites induit une **aneuploïdie**.

L'aneuploïdie est reconnue comme un facteur de risque de **tératogénicité, d'embryo-foetotoxicité, d'avortement spontané et d'altération de la fertilité masculine**, et comme un facteur de **risque potentiel de cancer**. Ce risque est plus important en cas d'exposition de longue durée.

Le thiolchicoside est **contre-indiqué** et **ne doit pas être utilisé** :

- **Chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception efficace**
- **Pendant toute la grossesse**
- **Pendant l'allaitement**
- **Chez les patients hypersensibles à la substance active ou à l'un des excipients**
- **En cas d'hypersensibilité à la colchicine**

Mesures à prendre **avant de prescrire/ dispenser thiocolchicoside pour prévenir le risque de génotoxicité** :

- **Les doses maximales et la durée de traitement recommandées ne doivent pas être dépassées,**
- **Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace,**
- **L'absence de grossesse et/ou d'allaitement doit être vérifiée,**

Thiocolchicoside doit être arrêté si la patiente est **enceinte, peut le devenir ou pense l'être, et la patiente devra consulter un médecin.**

Les professionnels de santé doivent informer les patients sur les risques associés à l'utilisation du thiocolchicoside, **et leur remettre la « Note d'information des patients ».**

Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit.

▼ Ces médicaments font l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament au Centre Antipoison et de Pharmacovigilance Maroc sur le site internet [www.capm.ma](http://www.capm.ma) ou par Tél : 0801 000 180